

# Nevertebrate din aria naturală protejată Munții Maramureșului



Croitor alpin/*Rosalia alpina*

Este o specie spectaculoasă care trăiește în complexul climatic al fagului și al coniferelor. Corpul este acoperit de peri mici, ca un puf, de culoare cenușiu-albăstrui sau cenușie-verzui, uneori aproape albăstru. Lungimea corpului este de 15-35 mm. Perioada de dezvoltare (de la ou până la adult) durează aproximativ 2-3 ani.



Cosaș transilvănean/  
*Pholidoptera transssylvanica*

Este o specie care preferă fânețele, tufișurile și arbuști. Culoarea corpului este castaniu întunecat, iar lungimea corpului este de 20-27 mm. Ambele sexe au fruntea galbenă, cu o dungă lată.



Cărăbuș/*Pseudogaurotina excellens*

Această specie are corpul lucios și negru, iar aripile sunt de culoare verzui-albăstrui sau albastru metalic. Adulții trăiesc pe flori și pe frunze și zboară în perioada iunie-iulie.



Fluture/*Lycaena dispar*

Trăiește pe pășuni îmbibate cu apă și mlăștinoase, la marginile cursurilor de apă, lângă canalele de irigații, câmpii largi, precum și bancuri de nisip. Masculii sunt teritoriali și sedentari, au culoarea roșie pe partea dorsală, în timp ce la femelă culoarea este portocalie, cu dungă marginală brună. Zboară din luna mai până în luna septembrie.



Cărăbuș/*Carabus hampei*

Această specie trăiește la marginile pădurilor de stejar și conifere, în stratul gros de frunze uscate aflate în descompunere. Are corp alungit, dimensiunea fiind între 29 și 37 mm. Cărăbușii prădători se recunosc ușor după corpul lor zvelt, coloratura neagră cu luciu metalic. Exemplarele tinere au culoarea maroniu închis.



Cărăbuș/*Carabus zawadzkii*

Este o specie carnivoră care se hrănește cu nevertebrate artropode. Lungimea corpului său variază între 26 și 31 mm. Trăiește doar în pădurile de conifere, mai ales în cele de molid.



Albiliță portocalie/*Colias myrmidone*

Este un fluture cu aripile anterioare de culoare galben-portocaliu, cu o pată neagră pe partea centrală și cu marginile exterioare brune. Trăiește în pășuni, fânețe și tufișuri și zboară din mai până în septembrie.



Melc bănățean carenat/  
*Chilostoma banaticum*

Este o specie de melc întâlnită în Repede, Bardău, Faina și pe Valea Vaserului. Preferă mediile umede, fiind întâlnit pe lângă pâraie, pe sol, pe sub bușteni sau pietre. Cochilia este brun-gălbuiu și are formă de lentilă, striată neregulat, cu dimensiuni cuprinse între 16 și 20 mm înălțime și 27 și 32 mm lățime.

